

Biodiversität in Gerlingen

Blühkalender

Farbenspiel Veitshöchheim (sonniger und trockener Standort)				Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Gerüstbildner															
Achillea filipendulina 'Coronation Gold', Goldgarbe	1	70	goldgelb, Juni-Sept.						■	■	■	■			
Achillea filipendulina 'Walter Funcke', Schafgarbe	1	70	rot, Juni-Sept.						■	■	■	■			
Aster amellus 'Veilchenkönigin', Sommeraster	3	55	dunkelviolett, Aug.-Sept.								■	■			
Hemerocallis citrina, Taglilie	2	100	hellgelb, Juni-Aug.						■	■	■				
Panicum virgatum 'Rehbraun', Rutenhirse	1	80	rotbraune/grünbraun, Juli-Sept.							■	■	■			
Gruppenstauden															
Coreopsis verticillata 'Zagreb', Mädchenauge	6	30	tiefgelb, Juni-sept.						■	■	■	■			
Hemerocallis lilioasphodelus, Wiesentagilie	3	75	hellgelb, Mai-Juni					■	■						
Knautia macedonica, Witwenblume	4	80	purpurrot, Juli-Aug.							■	■				
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk', Katzenminze	3	100	rosa, Juni-Sept.						■	■	■	■			
Origanum laevigatum 'Herrenhausen', Heidegünsel	3	50	purpurrosa, Aug.-Sept.								■	■			
Sedum telephium 'Matrona', Fettblatt	5	50	rosa Dolden, rötl. Blatt, Aug.-Okt.								■	■	■		
Bodendecker															
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee', Perlkörbchen	5	20	weiß, Juli-Sept.							■	■	■			
Calamintha nepeta 'Blue Cloud', Bergminze	11	40	hellblauviolett, Juli-Sept.							■	■	■			
Calamintha nepeta 'Triumphator', Bergminze	11	60	weiß, Juli-Sept.							■	■	■			
Nepeta x faassenii, Katzenminze	12	30	violettblau, Juni-Sept.						■	■	■	■			
Salvia verticillata 'Purple Rain', Salbei	5	45	purpurviolett, Mai-Sept.					■	■	■	■	■			
Streupflanzen															
Catananche caerulea, Rasselblume	4	60	violettblau, Juli-Aug.							■	■				
Zwiebeln															
Crocus tommasinianus, Krokus	80	10	lavendellila, Feb.-März		■	■									
Crocus chrysanthus 'Goldilocks', Krokus	80	10	tiefgelb, Feb.-März		■	■									
Muscari armeniacum, Traubenhyazinthe	40	20	kobaltblau, April-Mai				■	■							
Tulipa praestans 'Füsilier', Wildtulpe	20	25	orangescharlach, April				■								

Spezielle Pflegehinweise

Im Spätwinter erfolgt ein kräftiger Rückschnitt. Bei Nepeta und Knautia macedonica empfiehlt sich Ende Juni/Anfang Juli ein Sommerschnitt für eine üppige Nachblüte.

Generell sollen übers Jahr zwei bis vier Jätgänge vollzogen werden.

www.setup-landschaftsarchitektur.de

www.staudenring.com